

## 工作者接触芬太尼的风险

工作者可能会通过针刺、经皮接触、摄入、吸入或粘膜（如眼睛或鼻）接触到芬太尼。工作者更有可能通过短暂的经皮接触而接触到芬太尼。就临床有意义方式而言，急救人员经皮接触芬太尼的情况极少。

如果工作者采用适当的操作程序和通用预防措施，其通过摄入、吸入或针刺接触芬太尼的可能性就会降低。

## 芬太尼中毒的症状包括：

- 定向障碍
- 针尖样瞳孔
- 呼吸窘迫、呼吸抑制或呼吸停止
- 困倦
- 意识丧失
- 恶心/呕吐

如果接触到芬太尼并出现以上症状，请致电 (800) 222-1222 咨询 Washington 毒物中心。

## 预防过量

预防芬太尼过量需采取以下预防措施：

- 远离所有街头毒品
- 切勿服用超过规定剂量的药物
- 切勿混用药物
- 与医生讨论有无其他镇痛方法
- 手头备上纳洛酮 (Narcan)，可用于在过量的情况下进行紧急治疗。



## 背景介绍

近年来，芬太尼的使用越来越频繁，许多人甚至不知道自己在使用芬太尼。芬太尼的效力比海洛因强 50 倍，比吗啡强 100 倍。

随着芬太尼的使用和其在其他物质中的存在，其他人无意中接触到芬太尼的可能性也在增加。员工可以采取一些安全措施来降低接触芬太尼的风险。

## 什么是芬太尼？

芬太尼是一种类似吗啡的强效合成阿片类药物。医生开具芬太尼是用于治疗急性疼痛，但它也被非法制造并作为娱乐性药物在黑市上销售。当芬太尼与其他物质（包括海洛因、可卡因和甲基苯丙胺）一起使用时，其危险性就会增加。

不论种族、肤色、性别、宗教、信仰、婚姻状况、国籍、性取向、年龄、退伍军人身份或任何生理、感知或心理残疾，DCYF 不会歧视所有人，并为所有人提供平等获取其计划和服务的机会。

如果您想得到本出版物其他格式或语种的免费副本，请联系 DCYF Constituent Relations (DCYF 选民关系处)：拨打 1-800-723-4831 或发送电子邮件至

[communications@dcyf.wa.gov](mailto:communications@dcyf.wa.gov)。

DCYF PUBLICATION CWP\_0107 CHS (04-2023) Chinese Simplified


# 芬太尼的危险性

Washington State Department of  
**CHILDREN, YOUTH & FAMILIES**



## 安全注意事项

- 避免在已知或怀疑存在芬太尼的区域进食、饮水、吸烟或使用盥洗室。
- 处理可能受污染的表面后，避免揉眼睛、接触嘴巴或鼻子。
- 为降低接触危险，不建议使用芬太尼或与芬太尼近似的药物进行现场测试。
- 避免进行任何可能导致芬太尼在空气中传播的测试或搬运操作，并申请配备更多的个人防护装备和有资格的工作人员。
- 可能接触芬太尼后，在离开现场前，立即用肥皂和水洗手。
- 切勿将漂白剂或洗手液涂抹在沾染了芬太尼的皮肤处。



## 芬太尼过量的症状

芬太尼过量的症状包括：

- 动作减少
- 可能窒息
- 发出咕噜声或打鼾声
- 无法被唤醒
- 皮肤发冷发粘
- 瞳孔变小
- 呼吸缓慢甚至无呼吸
- 失去协调性
- 嘴唇和指甲发青
- 口齿不清或精神错乱

如果怀疑有人过量服用芬太尼或其他阿片类药物，请拨打 911 或立即寻求医疗帮助。任何出现阿片类药物过量症状的人都应服用纳洛酮。考虑到芬太尼的效力极强，有时需要服用几剂纳洛酮才能让接触者恢复正常呼吸。

