

## ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄດ້ຮັບສານ fentanyl ກັບ ພະນັກງານ

ພະນັກງານອາດຈະສໍາຜັດກັບ fentanyl ໂດຍໃຊ້ເຂັ້ມ, ການສໍາຜັດຜິວໜັງ, ການກິນ, ການສູບດິມ ຫຼື ການສໍາຜັດກັບເຍື່ອເມືອກເຊັ່ນ: ດວງຕາ ຫຼື ດັງ. ພະນັກງານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສໍາຜັດກັບ fentanyl ໂດຍຜ່ານການສໍາຜັດທາງຜິວໜັງເປັນເວລາສັ້ນໆໆ. ໜ່ວຍກູ້ໄພສຸກເສີນມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະສໍາຜັດກັບຜິວໜັງໃນລັກສະນະທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານຄລິນິກ.

ຖ້າພະນັກງານໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການລະມັດລະວັງທີ່ເປັນສາກົນ, ພວກເຂົາມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະຖືກສໍາຜັດທາງການກິນ, ສູບດິມ ຫຼື ເຂັ້ມສັກຢາ.

### ອາການຂອງພິດ fentanyl ປະກອບມີ:

- ອາການວິນຫົວ
- ມ່ານຕານ້ອຍລົງ
- ຫາຍໃຈຍາກ, ຊຶມເສົ້າ ຫຼື ການຢຸດເຕັ້ນ
- ອາການງ່ວງນອນ
- ການສູນເສຍສະຕິ
- ປວດຮາກ/ຮາກ

ໃນກໍລະນີຂອງການສໍາຜັດກັບ fentanyl, ແລະ ມີອາການເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ໂທຫາ (800) 222-1222 ໃຫ້ລິມັກັບ Washington ສູນພິດ.

### ການປ້ອງກັນ

ການປ້ອງກັນການໃຊ້ຢາເກີນປະລິມານຂອງຢາ fentanyl ກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະການປ້ອງກັນ, ເຊັ່ນ:

- ຫຼີກລ່ຽງຢາເສບຕິດຕາມຖະໜົນທຸກຊະນິດ
- ຢ່າກິນເກີນປະລິມານຢາທີ່ກຳນົດໄວ້
- ບໍ່ເຄີຍປະສົມຢາ
- ສິນທະນາກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບທາງເລືອກອື່ນໃນການຈັດການກັບອາການເຈັບປວດ
- ຕ້ອງມີຢາ Narcan ຕິດຕົວ ເພາະວ່າຈະໄດ້ໃຊ້ປິ່ນປົວສຸກເສີນສໍາລັບການກິນຢາເກີນປະລິມານ.



### ຄວາມເປັນມາ

ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການແຜ່ຫຼາຍຂອງ fentanyl ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ໂດຍປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາໃຊ້ fentanyl ຢູ່. Fentanyl ມີສັກກາຍະພາບແຮງກວ່າເຮໂອອິນ 50 ເທົ່າ ແລະ ແຮງກວ່າມໍຟິນ 100 ເທົ່າ.

ໂອກາດທີ່ຄົນອື່ນຈະສໍາຜັດກັບສານ fentanyl ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການນໍາໃຊ້ ແລະ ການມີຢູ່ຂອງມັນ. ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພບາງຢ່າງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍາຜັດກັບສານ fentanyl.

### fentanyl ແມ່ນຫຍັງ?

Fentanyl ແມ່ນຢາຝິ່ນສັງເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັບມໍຟິນ. ທ່ານ ໝໍ ສັ່ງໃຫ້ຢານີ້ສໍາລັບການປິ່ນປົວອາການເຈັບປວດໜັກ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກຜະລິດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຖືກແຈກຢາໄປຂາຍໃນຕະຫຼາດມືດເປັນຢາເພື່ອການພັກຜ່ອນ. ໄພອັນຕະລາຍຈາກ fentanyl ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອມັນຖືກນໍາໃຊ້ກັບສານອື່ນໆ, ລວມທັງເຮໂອອິນ, ໂຄເຄນອິນ, ແລະ ຢາບໍາ.

DCYF ບໍ່ມີການຈຳແນກ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມແກ່ທຸກຄົນໃນການເຂົ້າຫາໂຄງການ ແລະ ການບໍລິການຂອງຕົນ ໂດຍບໍ່ຄໍານິງເຖິງເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ເພດ, ສາສະໜາ, ຄວາມເຊື່ອ, ສະຖານະທາງຄອບຄົວ, ຊາດກຳເນີດ, ລົດສະນິຍົມທາງເພດ, ອາຍຸ, ສະຖານະນັກຮົບເກົ່າ ຫຼື ການມີຄວາມພິການທາງຮ່າງກາຍ, ທາງປະສາດສໍາຜັດ ຫຼື ທາງຈິດໃຈ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສໍາເນົາຂອງເອກະສານນີ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃນຮູບແບບອື່ນ ຫຼື ພາສາອື່ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ DCYF Constituent Relations (ຫ້ອງການປະຊາສໍາພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ DCYF) ທີ່ທິເບີ 1-800-723-4831 ຫຼື ສົ່ງອີເມວຫາ [communications@dcpf.wa.gov](mailto:communications@dcpf.wa.gov).

# ອັນຕະລາຍຈາກ Fentanyl

Washington State Department of CHILDREN, YOUTH & FAMILIES



## ຂໍ້ຄວນລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພ

- ຫຼີກເວັ້ນການກິນອາຫານ, ຕົ້ມ, ສູບຢາ, ຫຼື ໃຊ້ ຫ້ອງນໍ້າໃນເຂດທີ່ຮູ້ຈັກ ຫຼື ສິ່ງໃສ່ວ່າມີ fentanyl.
- ຫຼັງຈາກສໍາຜັດກັບພື້ນຜິວທີ່ອາດຈະປົນເປື້ອນ ແລ້ວ, ຫຼີກເວັ້ນການສໍາຜັດກັບຕາ, ປາກ, ຫຼື ດັ່ງ ຂອງທ່ານ.
- ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຂອງການສໍາຜັດ, ບໍ່ໄດ້ ແນະນຳໃຫ້ເຮັດການທົດສອບພາກສະໜາມກັບ fentanyl ຫຼື ຢາທີ່ໃກ້ຄຽງກັບ fentanyl.
- ຫຼີກເວັ້ນການເຮັດການທົດສອບ ຫຼື ການຈັດການ ກິດຈະກຳໃດໆທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ fentanyl ລອຍໄປ ໃນອາກາດ, ແລະ ຕິດຕໍ່ຫາ PPE ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ມີຄຸນຈຸດທີ່ເໝາະສົມເພີ່ມເຕີມ.
- ຫຼັງຈາກການສໍາຜັດກັບ fentanyl ທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແລະ ກ່ອນທີ່ຈະອອກຈາກສະຖານທີ່ເກີດເຫດ, ໃຫ້ລ້າງມືຂອງທ່ານດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າທັນທີ.
- ຫ້າມໃຊ້ຢາຟອກຫຼື ເຈວລ້າງມືໃສ່ຜິວໜັງ ທີ່ຕິດເຊື້ອ.



## ອາການຂອງການກິນຢາ fentanyl ຫຼາຍ ເກີນໄປ

ອາການຂອງການກິນຢາ fentanyl ຫຼາຍເກີນໄປ ປະກອບມີ:

- ຂາດການເຄື່ອນໄຫວ
- ຫາຍໃຈຍາກ
- ສຽງແກວ່ງ ຫຼື ສຽງດັງ
- ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕື່ນນອນໄດ້
- ຜິວໜັງເຢັນ ແລະ ໜຽວ
- ຮຸ່ມນາໂນຍລົງ
- ຫາຍໃຈຊ້າ ຫຼື ຂາດການຫາຍໃຈ
- ສູນເສຍການປະສານງານ
- ຮິມປາກ ແລະ ເລັບກາຍເປັນສີຟ້າ
- ເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ ຫຼື ສັບສິນ

ໂທຫາ 911, ຫຼື ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດ ທັນທີ, ຖ້າທ່ານສິ່ງໃສ່ວ່າມີຄືນກິນຢາ fentanyl ຫຼື ຝິນ ຊະນິດອື່ນ ຫຼາຍເກີນໄປ. ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ສະແດງອາການ ຂອງຢາຝິນ ເກີນປະລິມານ ຄວນໄດ້ຮັບຢາ Narcan. ເມື່ອພິຈາລະນາວ່າ fentanyl ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ ປານໃດ, ບາງຄັ້ງອາດຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ Narcan ຫຼາຍເພື່ອ ກັບຄືນສູ່ການຫາຍໃຈປົກກະຕິ.

