

Риски воздействия фентанила на сотрудников

Сотрудник может вступить в контакт с фентанилом при уколе иглы, контакте с кожей, проглатывании, вдыхании или контакте со слизистыми оболочками, например, с глазами или носом. Вероятность контакта с фентанилом у сотрудника выше при кратковременном контакте с кожей. У сотрудников служб экстренной помощи очень минимальный шанс подвергнуться клинически значимому контакту с кожей.

Если работники используют соответствующие процедуры и универсальные меры предосторожности, они с меньшей вероятностью заразятся при проглатывании, вдыхании или уколе иглой.

Признаки интоксикации фентанилом:

- Дезориентация
- Узкие зрачки
- Затрудненное дыхание или его остановка
- Сонливость
- Потеря сознания
- Тошнота/рвота

В случае воздействия фентанила и появления этих симптомов позвоните по телефону (800) 222-1222 в Токсикологический центр штата Washington.

Профилактика

Предотвращение передозировки фентанила предполагает принятие следующих мер предосторожности:

- Отказ от всех уличных наркотиков
- Никогда не принимайте больше назначенной дозы лекарства
- Никогда не смешивайте наркотики
- Поговорите со своим врачом об альтернативных вариантах лечения боли
- Иметь под рукой Наркан, потому что это средство экстренной помощи при передозировке.



Общие сведения

За последние годы использование и распространенность фентанила значительно возросли, причем многие люди не подозревают, что используют фентанил. Фентанил в 50 раз сильнее героина и в 100 раз сильнее морфина.

Вероятность того, что другие люди непреднамеренно вступят в контакт с фентанилом, возрастает по мере его использования и присутствия. Сотрудники могут принять определенные меры безопасности, чтобы снизить риск воздействия фентанила.

Что такое фентанил?

Фентанил — мощный синтетический опиоид, напоминающий морфин. Врачи прописывают его для лечения острой боли, но он также производится незаконно и распространяется на черном рынке в качестве рекреационного наркотика. Опасность фентанила возрастает при его употреблении с другими веществами, включая героин, кокаин и метамфетамин.


DCYF не дискриминирует и обеспечивает равный доступ к своим программам и услугам для всех людей, независимо от расы, цвета кожи, пола, религии, вероисповедания, семейного положения, национального происхождения, сексуальной ориентации, возраста, статуса ветерана или наличия каких-либо физических, сенсорных или умственных расстройств.

Если вам нужны бесплатные экземпляры этой публикации в альтернативном формате или на другом языке, свяжитесь с DCYF Constituent Relations (Отделом по связям с клиентами DCYF) по телефону 1-800-723-4831 или отправьте электронное письмо по адресу communication@dcyf.wa.gov.

DCYF PUBLICATION CWP_0107 RU (04-2023) Russian



Опасность фентанила



Washington State Department of
CHILDREN, YOUTH & FAMILIES

Меры предосторожности

- Не ешьте, не пейте, не курите и не пользуйтесь туалетом в местах, где известно или предполагается наличие фентанила.
- После работы с потенциально загрязненными поверхностями не прикасайтесь к глазам, рту или носу.
- Чтобы снизить опасность воздействия, не рекомендуется проводить полевые испытания фентанила или препаратов, близких к фентанилу.
- Избегайте каких-либо испытаний или действий, которые могут привести к попаданию фентанила в воздух. Обращайтесь за дополнительными средствами индивидуальной защиты и к квалифицированному персоналу.
- После возможного воздействия фентанила и перед тем, как покинуть место происшествия, немедленно вымойте руки с мылом.
- Никогда не наносите отбеливатели или дезинфицирующие средства для рук на зараженную кожу.



Симптомы передозировки фентанила

Передозировка фентанила имеет следующие симптомы:

- Затруднение движения
- Возможно удушье
- Булькающие звуки или храпящее дыхание
- Неспособность проснуться
- Холодная и липкая кожа
- Крошечные зрачки
- Медленное или отсутствующее дыхание
- Потеря координации
- Синие губы и ногти
- Невнятная речь или спутанность сознания

Позвоните 911 или немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы подозреваете, что у кого-то произошла передозировка фентанила или другого опиоида. Любому, у кого наблюдаются симптомы передозировки опиоидами, следует дать Наркан. Учитывая, насколько мощным может быть действие фентанила, иногда требуется несколько доз Наркана, чтобы вернуть человеку нормальное дыхание.

